RAÇÃO TOP LACTAÇÃO 22

Rações

Indicação:
Ração de pronto uso indicado para bovinos de leite em fase de lactação.

Modo de usar:
O produto deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é no mínimo de 40 cm/cabeça; Ex: para um lote de 100 animais será necessário um cocho com 40 metros lineares.

Faixa rocomendada de consumo:
Consumo diário de 1 kg de ração para cada 3 litros de leite produzidos.

Benefícios:
Ração desenvolvida para **alta produção e eficiência do rebanho leiteiro**, com **22% de proteína bruta e 80% de NDT estimado**, fornecendo alta concentração de energia e proteína para suporte à produção de leite. Sua formulação é enriquecida com **monensina**, que favorece o melhor aproveitamento da energia da dieta e a eficiência alimentar, além de um **perfil equilibrado de macro e microminerais**. Contém ainda **vitaminas A, D_3 e E**, que auxiliam na imunidade, reprodução, metabolismo e saúde do rebanho, contribuindo para **desempenho e produtividade ao longo da lactação**.

Diferenciais:
Monensina; 22% de Proteína Bruta; ; Vitaminas A, D3 e E.

Validade:
4 meses.

Apresentação:
Sacaria com 30 kg

Níveis de garantia (por kg do produto)

Proteína bruta (Mín)	220	g/kg
NNP Eq. PB (Máx)	28	g/kg
NDT estimado (Mín)	800	g/kg
Fibra bruta (Máx)	38	g/kg
Cálcio (Mín)	10	g/kg
Cálcio (Máx)	13	g/kg
Fósforo (Mín)	3800	mg/kg
Magnésio (Mín)	3000	mg/kg
Sódio (Mín)	3800	mg/kg
Enxofre (Mín)	3000	mg/kg
Cobalto (Mín)	07	mg/kg
Cobre (Mín)	35	mg/kg
Iodo (Mín)	1	mg/kg
Manganês (Mín)	89	mg/kg
Selênio (Mín)	086	mg/kg
Zinco (Mín)	135	mg/kg
Vitamina A (Mín)	10000	UI/kg
Vitamina D3 (Mín)	1700	UI/kg
Vitamina E (Mín)	18	UI/kg
Monensina (Mín)	31	mg/kg
Flúor (Máx)	4	mg/kg
FDA (Mín)	41	g/kg
Extrato Etéreo (Mín)	37	g/kg

