# RAÇÃO TOP LACTAÇÃO 22

Rações

**Indicação:**
Ração de pronto uso indicado para bovinos de leite em fase de lactação.

**Modo de usar:**
O produto deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é no mínimo de 40 cm/cabeça; Ex: para um lote de 100 animais será necessário um cocho com 40 metros lineares.

**Faixa rocomendada de consumo:**
Consumo diário de 1 kg de ração para cada 3 litros de leite produzidos.

**Benefícios:**
Ração desenvolvida para **alta produção e eficiência do rebanho leiteiro**, com **22% de proteína bruta e 80% de NDT estimado**, fornecendo alta concentração de energia e proteína para suporte à produção de leite. Sua formulação é enriquecida com **monensina**, que favorece o melhor aproveitamento da energia da dieta e a eficiência alimentar, além de um **perfil equilibrado de macro e microminerais**. Contém ainda **vitaminas A, $D_3$ e E**, que auxiliam na imunidade, reprodução, metabolismo e saúde do rebanho, contribuindo para **desempenho e produtividade ao longo da lactação**.

**Diferenciais:**
Monensina; 22% de Proteína Bruta; ; Vitaminas A, D3 e E.

**Validade:**
4 meses.

**Apresentação:**
Sacaria com 30 kg

## Níveis de garantia (por kg do produto)

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (Mín) | 220 | g/kg |
| NNP Eq. PB (Máx) | 28 | g/kg |
| NDT estimado (Mín) | 800 | g/kg |
| Fibra bruta (Máx) | 38 | g/kg |
| Cálcio (Mín) | 10 | g/kg |
| Cálcio (Máx) | 13 | g/kg |
| Fósforo (Mín) | 3800 | mg/kg |
| Magnésio (Mín) | 3000 | mg/kg |
| Sódio (Mín) | 3800 | mg/kg |
| Enxofre (Mín) | 3000 | mg/kg |
| Cobalto (Mín) | 07 | mg/kg |
| Cobre (Mín) | 35 | mg/kg |
| Iodo (Mín) | 1 | mg/kg |
| Manganês (Mín) | 89 | mg/kg |
| Selênio (Mín) | 086 | mg/kg |
| Zinco (Mín) | 135 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín) | 10000 | UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín) | 1700 | UI/kg |
| Vitamina E (Mín) | 18 | UI/kg |
| Monensina (Mín) | 31 | mg/kg |
| Flúor (Máx) | 4 | mg/kg |
| FDA (Mín) | 41 | g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín) | 37 | g/kg |

