



PRÓ BEZERRO

Proteicos Energéticos

Indicação:

Suplemento mineral proteico energético de pronto uso para bovinos de corte nas fase de aleitamento e desmama.

Modo de usar:

O produto deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é de no mínimo 25 cm/cabeça, ex: para um lote de 100 animais será necessário um cocho com 25 metros lineares.

Faixa recomendada de consumo:

Consumo esperado de 2 a 3 g por kg de peso vivo para animais em aleitamento.

Consumo esperado de 4 a 6 g por kg de peso vivo para animais em desmama

Benefícios:

Suplemento mineral proteico energético desenvolvido para **bovinos em aleitamento e pós-desmama**, fornecendo energia, proteína e minerais essenciais para crescimento e desempenho. Com **22% de proteína bruta e 70% de NDT**, sua formulação contém **lasalocida**, que melhora a eficiência alimentar e possui **ação coccidiostática**, auxiliando no controle da coccidiose, na saúde intestinal e no desempenho dos bezerros. Conta ainda com **parede de leveduras e cromo orgânico**, que oferecem suporte à **saúde digestiva, imunidade e resposta ao estresse**, contribuindo para animais mais saudáveis e eficientes. Para melhores resultados, seu uso deve estar associado à **boa disponibilidade de pastagem**.

Diferenciais:

22% de Proteína bruta; Alta energia; Cromo orgânico; Lasalocida; Parede de leveduras; Ureia protegida.

Validade:

6 meses.

Apresentação:

Saco de 30 kg.

Níveis de garantia (por kg do produto)

Proteína Bruta (Mín)	220	g/kg
NNP Equiv. Proteína (Máx)	40	g/kg
Extrato Etéreo (Mín)	32	g/kg
NDT (Mín)	700	g/kg
Cálcio (Mín)	20	g/kg
Cálcio (Máx)	31	g/kg
Fósforo (Mín)	10	g/kg
Magnésio (Mín)	3200	mg/kg
Sódio (Mín)	12	g/kg
Enxofre (Mín)	6000	mg/kg
Potássio (Mín)	7300	mg/kg
Cobalto (Mín)	12	mg/kg
Cobre (Mín)	136	mg/kg
Flúor (Máx)	59	mg/kg
Ferro (Mín)	30	mg/kg
Iodo (Mín)	7	mg/kg
Cromo Orgânico (Mín)	5	mg/kg
Manganês (Mín)	144	mg/kg
Selênio (Mín)	4	mg/kg
Zinco (Mín)	400	mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín)	198	g/kg
Lasalocida (Mín)	90	mg/kg
Beta-glucanas (Mín)	242	g/kg

