CONCENTRADO LEITE

Concentrados

Indicação:
Concentrado indicado para o preparo de rações para bovinos de leite na fase de lactação.

Modo de usar:
Misturar na proporção de 40% de concentrado e 60% de milho moído, para uma ração de 20% de PB. Misturar na proporção de 45% de concentrado e 55% de milho moído, para uma ração de 22% de PB. Misturar na proporção de 50% de concentrado e 50% de milho moído, para uma ração de 24% de PB.
2ª opção:
Misturar na proporção de 40% de concentrado e 55% de milho moído e 5% de farelo de soja, para uma ração de 22% de PB. Misturar na proporção de 40% de concentrado e 50% de milho moído e 10% de farelo de soja, para uma ração de 24% de PB.
Depois de misturado deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é de no mínimo 40 cm/cabeça; Ex: para um lote de 100 animais será necessário um cocho com 40 metros lineares.

Faixa rocomendada de consumo:
Consumo esperado de 1 kg da ração para cada 3 L de leite produzido.

Benefícios:
Concentrado formulado com proteina e energia para preparo de rações para bovinos de leite na fase de lactação. Contém monensina sódica, aditivo que garante maior conversão alimentar e redução de riscos de distúbios digestivos, garantindo assim uma maior produção de leite e lucratividade. Possui complexo de vitaminas A, D3 e E,vitaminas necessárias para produção de hormônios reprodutivos, absorção de minerais e aumento da imunidade, garantindo uma boa saúde do trato reprodutivo e glândula mamária.

Diferenciais:
Monensina sódica; Vitaminas A, D e E.

Validade:
6 meses.

Apresentação:
Sacaria com 25 kg.

Níveis de garantia (por kg do produto)

Proteína Bruta (Mín)	420	g/kg
NNP Equiv. Proteína (Máx)	100	g/kg
NDT (Mín)	650	g/kg
Cálcio (Mín)	32	g/kg
Cálcio (Máx)	50	g/kg
Fósforo (Mín)	6000	mg/kg
Magnésio (Mín)	7000	mg/kg
Sódio (Mín)	12	g/kg
Enxofre (Mín)	10	g/kg
Cobalto (Mín)	6	mg/kg
Cobre (Mín)	80	mg/kg
Flúor (Máx)	10	mg/kg
Iodo (Mín)	35	mg/kg
Manganês (Mín)	72	mg/kg
Selênio (Mín)	2	mg/kg
Zinco (Mín)	340	mg/kg
Vitamina A (Mín)	37000	UI/kg
Vitamina D3 (Mín)	7400	UI/kg
Vitamina E (Mín)	30	UI/kg
Monensina Sódica (Mín)	100	mg/kg

