



COLOSSAL LEITE

Rações

Indicação:

Ração peletizada de pronto uso para bovinos de leite em fase de lactação.

Modo de usar:

O produto deve ser fornecido puro em cochos de fácil acesso pelos animais, de preferência cobertos. A disponibilidade de cochos é de no mínimo 30 cm/cabeça; Ex: para um lote de 100 animais será necessário um cocho com 30 metros lineares.

Faixa recomendada de consumo:

Consumo indicado de 1 kg de ração para cada 3 L de leite produzidos.

Benefícios:

Desenvolvida para **desempenho, saúde e praticidade**, esta ração peletizada fornece **24% de proteína bruta**, energia e minerais em equilíbrio para o rebanho leiteiro. A associação de **monensina, cromo orgânico e levedura autolisada** favorece a eficiência alimentar, o metabolismo energético e a saúde ruminal, contribuindo para melhor aproveitamento da dieta e desempenho produtivo. Enriquecida com **vitaminas A, D₃ e E e biotina**, oferece suporte à **imunidade, reprodução, metabolismo e saúde dos cascos**, contribuindo para a saúde e longevidade produtiva do rebanho. A **peletização** proporciona maior uniformidade de consumo e menor desperdício no cocho.

Diferenciais:

Ração em pellets; Alta digestibilidade; Monensina Sódica; Cromo Orgânico; Levedura; Biotina; Vitaminas A, D₃ e E.

Validade:

4 meses.

Apresentação:

Sacaria com 30 kg.

Níveis de garantia (por kg do produto)

Proteína bruta (Mín)	240	g/kg
NNP Eq. PB (Máx)	30	g/kg
NDT (Mín)	800	g/kg
Fibra bruta (Máx)	35	g/kg
Cálcio (Mín)	9000	mg/kg
Cálcio (Máx)	11	g/kg
Fósforo (Mín)	3800	mg/kg
Magnésio (Mín)	3000	mg/kg
Sódio (Mín)	3800	mg/kg
Enxofre (Mín)	3000	mg/kg
Cobalto (Mín)	2	mg/kg
Cobre (Mín)	35	mg/kg
Iodo (Mín)	1	mg/kg
Manganês (Mín)	89	mg/kg
Selênio (Mín)	085	mg/kg
Zinco (Mín)	140	mg/kg
Cromo Orgânico (Mín)	1	mg/kg
Vitamina A (Mín)	15000	UI/kg
Vitamina D3 (Mín)	2700	UI/kg
Vitamina E (Mín)	23	UI/kg
Monensina (Mín)	31	mg/kg
Levedura autolisada (Mín)	2	g/kg
Extrato Etéreo (Mín)	28	g/kg
FDA (Mín)	66	g/kg
Potássio (Mín)	8800	mg/kg
Flúor (Máx)	3	mg/kg
Ferro (Mín)	54	mg/kg
Biotina (Mín)	25	mg/kg

